



## Entretien des prairies

Que les chevaux vivent à l'extérieur ou n'y passent que quelques heures par jour, les surfaces en herbe sur lesquelles ils évoluent en liberté nécessitent un entretien particulier.

### Gestion des zones de refus

Le comportement alimentaire du cheval a un impact sur la composition de la prairie. Il concentre par exemple ses déjections à proximité des espèces végétales les moins appétantes : ce sont les latrines. Le crottin agissant comme un engrais sur ces espèces indésirables, elles prolifèrent et il se forme alors des zones de refus, où l'herbe n'est peu voire pas consommée. Elles peuvent représenter jusqu'à 50% de la surface de la parcelle.

Quelles solutions ?

- Raisonner le chargement de la pâture : la parcelle ne doit pas être trop grande pour le nombre de chevaux présents pour éviter qu'ils ne soient amenés à délaisser certaines zones.
- Fauchez régulièrement les zones de refus. Les déchets verts peuvent être compostés seuls ou avec du fumier de cheval.

### Ramassage des crottins

Si la rotation des pâtures est suffisante, il n'est pas nécessaire de ramasser les crottins. En revanche, si les chevaux restent toujours sur la même parcelle et dans les paddocks qui voient se succéder des animaux différents, cette étape est indispensable et doit être effectuée le plus régulièrement possible. Ce fumier peut être composté, pour en savoir plus, consultez la fiche correspondante en cliquant [ici](#).


### Hersage

Le hersage se réalise sur les prairies rases. Il permet d'aérer le sol, d'étaler les crottins, de limiter les refus ultérieurs, d'arracher les plantes rampantes et d'éliminer la végétation morte et les adventices qui se développent sur les pâtures épuisées. Les adventices sont les espèces végétales qui se répandent dans une prairie sans avoir été intentionnellement semées et qui font concurrence aux autres espèces.

### Pensez à l'association d'herbivores !

Le pâturage mixte bovins-équins est une excellente association car ces deux espèces se complètent à plusieurs niveaux :

- les modes de pâturage : le cheval pâture ras grâce à ses incisives alors que la vache arrache l'herbe plus haut avec sa langue ;
- les plantes consommées, ce qui limite considérablement les zones de refus ;
- les parasites.



Selon la production fourragère, les bovins et les chevaux pâturent simultanément ou à tour de rôle : des chevaux à l'entretien entreront dans la parcelle après les bovins qui auront alors consommé l'herbe la plus riche, alors que des chevaux présentant des besoins plus importants pâturent en premier.